

ECOAR MEDICINA DIAGNÓSTICA

Tomografia de Mastóides

Prezado(a) paciente,

Objetivando uma melhor avaliação de sua condição clínica, favor seguir as orientações do protocolo do exame solicitado.

Orientações Necessárias:

- É necessário jejum absoluto de 4 horas, inclusive de água; no entanto, **qualquer medicação de uso contínuo, que não tenha sido suspensa por orientação do médico solicitante**, pode ser ingerida com um pouco de água.

- Pacientes que necessitem de sedação ou anestesia: Jejum absoluto de 8 horas, inclusive de água. Trazer relatório médico e comparecer com um acompanhante.

- **DIABÉTICOS:** caso utilizem algum dos medicamentos abaixo**, deverão solicitar a autorização do médico que indicou o exame para suspender o uso 2 dias antes da realização do exame, devido à possibilidade de injeção do contraste endovenoso.

** CLORIDRATO DE METFORMINA, presente nos medicamentos: Avandamet, Aktos, Diaformin, Dimefor, Formet, Galvus, Glicefor, Glicomet, Glifage, Glucofage, Glucoformin, Glucovance, Meguanin, Metfordin, Metform, Metformina, Metformix, Neo Metformin, Starform, Teutoformin.

- Trazer exames anteriores da região a ser examinada, caso possua.

Observações:

- Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável no dia do exame.

- Chegar 20 minutos antes do horário agendado.

- Trazer o pedido médico.

Agendamento:

Este exame deve ser agendado com antecedência. Para agendar, ligue para nossa **Central de Agendamento** ou solicite agendamento aqui.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Agendamento – (31) 3289-7400