

# ECOAR MEDICINA DIAGNÓSTICA

## Pesquisa de Divertículo de Meckel

Prezado(a) paciente,

Objetivando uma melhor avaliação de sua condição clínica, favor seguir as orientações do protocolo do exame solicitado.

### Orientações Necessárias:

- Este exame é utilizado na pesquisa de mucosa gástrica ectópica.
- É necessário jejum de 04 horas para a realização do exame. Em caso de pacientes recém-nascidos ou lactentes, suspender a última mamada.
- Informe-nos caso tenha, recentemente, realizado uma tomografia computadorizada ou Rx com contraste.
- Informe caso esteja em uso de Perclorato ou medicamento que contenha Iodeto de Potássio (KCl).
- O tempo médio necessário para a realização do exame é de 01 hora.
- Traga seus exames prévios, relativos ao motivo do exame (cintilografia prévia, colonoscopia, Rx, tomografia e ressonância magnética).
- Mulheres grávidas devem obrigatoriamente informar sua condição antes da injeção do radiofármaco. Lactantes devem descontinuar a amamentação por 24 horas após a injeção.

Caso as orientações acima não sejam observadas, o exame pode não ser realizado

### Observações:

- Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável no dia do exame.
- Chegar 20 minutos antes do horário agendado.
- Trazer o pedido médico.

### Agendamento:

Este exame deve ser agendado com antecedência. Para agendar, ligue para nossa **Central de Agendamento** ou solicite agendamento aqui.

**Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Agendamento – (31) 3289-7400**

